



その事故、防げます。

小さな「うっかり」が、大きな事故につながります

乳幼児の死亡原因

	乳児(0歳)	幼児(1歳～4歳)
1位	先天性奇形など	先天性奇形など
2位	呼吸障害など	不慮の事故
3位	不慮の事故	悪性新生物(がん)

不慮の事故による死因の年齢別詳細順位

	1位	2位	3位
0歳	ベッド上での窒息	誤えん	詳細不明の窒息
1歳	交通事故	浴槽での溺水	誤えん
2歳	交通事故	誤えん	浴槽での溺水
3歳	交通事故	誤えん	海・川等での溺水
4歳	交通事故	建物からの転落	(引用元:厚生労働省人口動態調査)

✓ 年齢別に多い事故を知って、防ぎましょう



0歳児の特徴

- ✓ 身の回りにある全てのものに興味を示す
- ✓ なんでも口に入れる
- ✓ 危険を予知することができない

対策

- ・小さい物を手の届く場所に置かない

※トイレットペーパーの芯を通る大きさの物は容易に口に入れられ、窒息する可能性が高いです。

- ・赤ちゃんの目線で危険を確認する



1歳児～2歳児の特徴

- ✓ できることが増え、歩き回ったり、なんでも触る
- ✓ 行動範囲が急に広がる

対策

- ・目を離さない
- ・お風呂に残り湯をためない、水まわりは特に注意する



3歳児以上の特徴

- ✓ 行動が活発になる

対策

- ・危険と安全について十分に教える



急な病気や怪我…迷った時は！

小児救急でんわ相談



急な発熱・頭をぶつけた・嘔吐、けいれんなど 判断に困ったら

8 0 0 0

救急電話相談

24時間365日 看護師が対応をアドバイス
医療機関も案内

7 1 1 9

対応してくれる病院がわからない時は

医療情報案内 ☎ 077-553-3799

滋賀県ホームページにも掲載しています。

滋賀県救急医療情報



【こども版】救急車が必要なとき

こんなときにはすぐに119番!!

こども（15歳以下）



意識の障害

- 意識がない（返事がない）またはおかしい（もうろうとしている）

けいれん

- けいれんが止まらない
- けいれんが止まっても、意識がもどらない

飲み込み

- 物をのどにつまらせて、呼吸が苦しい、意識がない

じんましん

- 虫に刺されて全身にじんましんが出て、顔色が悪くなった

やけど

- 痛みのひどいやけど
- 広範囲のやけど

事故

- 交通事故にあった（強い衝撃を受けた）
- 水におぼれている
- 高いところから落ちた

生まれて3カ月未満の乳児

- 乳児の様子がおかしい

◎その他、お母さんやお父さんから見て、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

※判断に迷った時は、お近くの電話相談窓口にご相談下さい。子ども医療電話相談（主に休日・夜間）は#8000、119番通報の相談は#7119をご利用いただけます。

総務省消防庁「救急車利用リーフレット（子供版）」から政府広報室作成

大切な命を助けるために…



救急車の適正利用をお願いします。

湖南広域行政組合

YouTube

「誰でもできる応急手当シリーズ」



問い合わせについて
湖南広域消防局
中消防署 安全救急係
☎077-552-0119

